

CREST

Postoperatieve rehabilitatie versus standard care voor resectabele HPB patiënten

Resectabele HPB patiënt

INCLUSIE CRITERIA

- Klinisch suspect of histologisch bewezen HCC, galwegcarcinoom pancreascarcinoom of invasieve IPMN
- Komt in aanmerking voor een in opzet curatieve resectie
- Levensverwachting > 6 maanden
- Beheersing Nederlandse taal

EXCLUSIE CRITERIA

- Cognitief of fysiek ernstig beperkt
- ECOG ≥ 3 (karnofski < 50)
- BMI < 15 kg/m²
- Hartfalen (NYHA \geq II)
- Psychiatrische angst of depressie
- Woonachtig in zorginstelling
- Kanker behandeling < 3jr geleden (met uitzondering van basaalcarcinoom)
- Deelname aan andere studie met fysio-/psychotherapeutische interventie



INCLUSIE en RANDOMISATIE via

<https://erasmusmsurvey.erasmusmc.nl/crest/>

EINDPUNTEN:

Primair: MVI-20 General Fatigue 12 maanden na OK

Secundair: o.a. Spiermassa, QoL, frailty index, Cost effectiveness

FOLLOW-UP:

Poliklinisch vervolg: 2wk, 17wk na ontslag, 6mnd en 12mnd na OK

CT abdomen 2wk, 17wk na ontslag. Daarna reguliere follow-up

CREST

Post operatieve rehabilitatie vs. Standard of care voor resectabele HPB patiënten

Samenvatting

Probleem:


Langdurige vermoeidheid na resectie

Doel: Eerder Beter

Eerder herstel ervaren en QoL/energie level verhogen

Plan:

Rehabilitatie met fysiotherapie, psychotherapie en diëtetiek



Vragen? Neem contact op!

Rowan van Gerven: 06 50033541, Berend Beumer: 06 36144632

crest.studie@erasmusmc.nl - b.beumer@erasmusmc.nl